

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES NA PRODUÇÃO DE LEITE

MÊS DE JANEIRO		
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Diferir áreas para colher sementes ou deixar sementar as pastagens. Utilizar pastagens de verão (principalmente no sistema rotativo)
	Pastagens anuais	Adquirir fertilizantes e sementes para pastagens de inverno. Revisar ou providenciar maquinário para plantio das pastagens de inverno. Utilizar pastagens de verão.
	Silagem	Revisar os silos, providenciar máquinas para ensilar e adquirir lona plástica
	Feno	Diferir áreas de pastagens para fazer feno. Fazer feno. Adquirir feno de alfafa.
	Milho para grão e silagem	Capinar quando necessário. Após capina aplicar fertilizante se necessário.
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
	Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

MÊS DE FEVEREIRO		
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Colher sementes dos pastos ou deixar sementar. Diferir área de pastagem para reforçar o outono. Utilizar pastagens de verão.
	Pastagens anuais	Preparar as terras para plantio das pastagens de inverno. Utilizar pastagens de verão.
	Milho para grão e silagem	Capinar quando necessário. Após capina aplicar fertilizante se necessário. Fazer silagem quando o milho estiver no ponto.
	Feno	Diferir áreas de pastagens para fazer feno. Fazer feno. Adquirir feno de alfafa.
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Raiva	Vacinar os animais onde houver focos e aparecimento de morcegos.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
	Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

		MÊS DE MARÇO
ASSUNTO E PRÁTICA		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão. Roçar os poteiros após a saída das vacas e fertilizar. Diferir área de pastagem para outono.
	Pastagens anuais	Plantar pastagens de inverno. Utilizar pastagens de verão.
	Milho para grão e silagem	Iniciar colheita de grão. Fazer silagem quando o milho estiver no ponto.
	Silagem	Iniciar a fornecer, aos poucos, a silagem.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade. Testar as fêmeas e eliminar as portadoras da doença.
	Tuberculose	Testar todos os animais e eliminar os portadores da doença.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.	
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

MÊS DE ABRIL		
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão. Usar as pastagens diferidas com cerca elétrica.
	Pastagens anuais	Plantar pastagens de inverno. Iniciar o uso de pastagens de inverno.
	Milho para grão	Colher milho para grãos.
	Silagem	Fornecer silagem conforme programado.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Carbúnculo sintomático	Vacinar, anualmente, dos seis meses até oito anos, debaixo do couro.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

MÊS DE MAIO		
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Roçar os poteiros de pastagens de verão e fertilizar. Usar as pastagens diferidas com cerca elétrica.
	Pastagens anuais	Plantar pastagens de inverno. Iniciar o uso de pastagens de inverno.
	Milho para grão	Armazenar o milho em lugar adequado.
	Silagem	Fornecer silagem conforme programado.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Carbúnculo hemático	Vacinar uma vez por ano, debaixo do couro.
	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.	
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

MÊS DE JUNHO		
ASSUNTOS E PRÁTICAS	ATIVIDADES	
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão, com moderação e conforme o clima permita, pensando sempre na manutenção do pasto.
	Pastagens anuais	Utilizar pastagens de inverno.
	Silagem	Fornecer silagem conforme programado.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Hemoglobinúria bacilar	Vacinar duas vezes por ano debaixo do couro.
	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

MÊS DE JULHO		
ASSUNTOS E PRÁTICAS	ATIVIDADES	
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão, com moderação e conforme o clima permita, pensando sempre na manutenção do pasto. Adquirir fertilizantes e sementes para pastagens de verão. Revisar o maquinário de preparo da terra e plantio.
	Pastagens anuais	Usar pastagens de inverno. Após pastejo aplicar fertilizantes. Adquirir adubos e sementes de pastagens de verão. Revisar maquinário de preparo da terra e plantio.
	Milho para grão e silagem	Revisar maquinário de preparo da terra e plantio do milho e providenciar sementes e fertilizantes.
	Silagem	Dependendo da quantidade de silagem, diminuir, aos poucos, o fornecimento. Comprar fertilizantes e sementes para o plantio de forrageiras para silagem.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
	SANIDADE E MANEJO	Brucelose
Pneumoenterite		Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose		Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas		Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e moscas do chifre		Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite		Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura, inseminação		Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição		Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
Desmame		Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro		Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
Registros de serviços		Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico		Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o calor		Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

		MÊS DE AGOSTO
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão conforme sua produção e o clima permita. Preparar a terra para plantio das pastagens de verão.
	Pastagens anuais	Usar pastagens de inverno. Após pastejo aplicar fertilizantes. Preparar a terra para plantio das pastagens de verão.
	Milho para grão e silagem	Preparar a terra para o plantio do milho.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

		MÊS DE SETEMBRO
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar (pastoreio rotativo). Plantar pastagens de verão.
	Pastagens anuais	Usar pastagens de inverno. Plantar pastagens de verão.
	Milho para grão e silagem	Plantar milho
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade. Testar todas as fêmeas e eliminar as portadoras da doença.
	Tuberculose	Testar todos os animais e eliminar os portadores da doença.
	Carbúnculo hemático	Vacinar uma vez por ano, debaixo do couro.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.	
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

		MÊS DE OUTUBRO
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar (pastoreio rotativo). Plantar pastagens de verão.
	Pastagens anuais	Usar pastagens de inverno. Plantar pastagens de verão. Iniciar a utilização das pastagens de verão.
	Milho para grão e silagem	Plantar milho.
	Feno	Fornecer feno na transição inverno-primavera e conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
	Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

MÊS DE NOVEMBRO		
ASSUNTOS E PRÁTICAS	ATIVIDADES	
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar (pastoreio rotativo).
	Pastagens anuais	Usar pastagens de verão. Plantar pastagens de verão.
	Milho para grão e silagem	Capinar e fertilizar cerca de 45 dias após a emergência.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade. Diferir área de pastagem para fazer feno.
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Gangrena gasosa	Vacinar, em zonas onde há a doença, debaixo do couro.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
	Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

		MÊS DE DEZEMBRO
ASSUNTOS E PRÁTICAS		ATIVIDADES
ALIMENTAÇÃO	Pastagens perenes	Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar (pastoreio rotativo).
	Pastagens anuais	Usar pastagens de verão. Após pastejo fertilizar.
	Milho para grão e silagem	Capinar quando necessário.
	Feno	Fornecer feno, conforme a necessidade
	Concentrado	Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras. Adquirir concentrado.
	Minerais	Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
SANIDADE E MANEJO	Brucelose	Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
	Hemoglobinúria bacilar	Vacinar duas vezes por ano, debaixo do couro.
	Pneumoenterite	Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e as terneiras com 15 dias de idade.
	Verminose	Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens. Repetir o tratamento de três em três meses.
	Bernes e sarnas	Observar e combater quando aparecerem.
	Carrapatos e moscas do chifre	Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade. Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
	Mamite	Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
	Cobertura, inseminação	Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados. Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado (Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8 horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio 60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no inverno/primavera e 40% no verão/outono.
	Parição	Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete perto da casa para poder observar melhor.
	Desmame	Desmamar as terneiras quando o consumo de ração concentrada chegar a 700g por dia.
	Controle leiteiro	Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de baixa produção na lactação ou com outros problemas (reprodução, etc.)
	Registros de serviços	Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante cada mês, na ficha de serviços.
	Controle econômico	Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o calor	Deixar os animais em poteiros com sombra e água. Não sendo possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do galpão.	
Controle da qualidade do leite	Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.	

Fonte: Eng. Agr. Breno Kirchof – Ascar/Emater/RS